

PRELEVEMENT VAGINAL OU CERVICO-VAGINAL A VISEE MICROBIOLOGIQUE

Recueil de sécrétions vaginales associé ou non à un prélèvement d'endocol dans le but de mettre en évidence des agents infectieux (bactéries, champignons, parasites, virus) responsables de pathologies du tractus génital. Protocole de prélèvement simplifié en fin de grossesse lorsque la recherche concerne uniquement le streptocoque B.

▪ **Conditions initiales :**

- Prendre rendez-vous au laboratoire
- La patiente doit éviter toute toilette intime, tout traitement local (crème, gels, savons...) ainsi que tout rapport sexuel dans les 24 heures précédant l'examen.
- De préférence en dehors de la période des règles car la flore est modifiée (sauf avis contraire du prescripteur).
- Avant toute antibiothérapie locale (ovules) ou générale (> à 15 jours pour les Chlamydiae, > à 5 jours pour les autres germes).

▪ **Déroulement :**

- Prise des renseignements médicaux
- Installation de la patiente en position gynécologique
- Prélèvement par écouvillons stérile et à usage unique
- Les écouvillons prélevés sont transmis rapidement en microbiologie pour ensemencement sur milieux spécifiques

▪ **Résultats :**

- 5 à 7 jours, variable selon les identifications et/ou antibiogrammes à réaliser